

# Votre calendrier vaccinal :

quel vaccin faire et à quel moment ?



	1 mois	2 mois	3 mois	4 mois	5 mois	6 mois	11 mois	12 mois	16/18 mois	À partir de 6 ans
<b>Gastroentérite aiguë à rotavirus</b> <small>(2 à 3 doses selon le vaccin utilisé)</small>		Date :	Date :	Date :						
<b>Tuberculose (BCG)</b>	Date :									
<b>Méningocoque B</b>			Date :		Date :			Date :		
<b>Diphtérie Tétanos Poliomyélite (DTP)</b>		Date :		Date :			Date :			Date :
<b>Coqueluche</b>		Date :		Date :			Date :			Date :
<b>Pneumocoque</b>		Date :		Date :			Date :			
<b>Hépatite B</b>		Date :		Date :			Date :			
<b>Haemophilus influenzae de type b (Hib)</b>		Date :		Date :			Date :			
<b>Méningocoques ACWY</b>						Date :		Date :		
<b>Rougeole Oreillon Rubéole (ROR)</b>								Date :	Date :	
<b>Varivax</b>								Date :		

: 1<sup>er</sup> ou 2<sup>e</sup> vaccination

: Rappel

: 2 doses à au moins 4 semaines d'intervalle

: Vaccins obligatoires pour être accueilli en collectivité (crèche, garderie, école...).